


Lo Que Usted Puede Hacer Para Proteger al Playero Melódico.

- Respete las áreas cercadas o marcadas para la protección de vida silvestre.
- No se acerque ni permanezca cerca de los playeros o de sus nidos.
- Si se permiten mascotas en la playa, manténgalas amarradas.
- No deje o entierre basura o sobras de comida en la playa. Los desperdicios atraen depredadores que pueden depredar huevos o polluelos del playero melódico.



El playero melódico está protegido bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.

Para más información, comuníquese con: Office of Endangered Species, U.S. Fish and Wildlife Service, One Gateway Center, Newton Corner, Massachusetts 02158, o comuníquese con su Agencia de Recursos Naturales en su estado.

Illustrations by Julie Zickeloose



DEP Wildlife Division
Franklin Wildlife
391 Route 32
North Franklin, CT 06254

Ayúdenos a Proteger



el Playero Melódico


Descripción

El playero melódico es un ave pequeña y de color arena. El playero adulto tiene las patas amarillo-anaranjadas, una franja negra en la frente que se extiende de ojo a ojo y una banda negra alrededor del pescuezo. Los playeros son corredores rápidos y tienen el hábito peculiar de correr a poca distancia y detenerse abruptamente. Cuando está quieto, el playero melódico se confunde con el fondo pálido del hábitat arenoso en donde anida y se alimenta.

Distribución y Abundancia en la Costa del Atlántico

El playero melódico anida en las costas desde Terranova y el sureste de Quebec hasta Carolina del Norte. En invierno emigra al sur habitando la costa entre Carolina del Norte y la Florida aunque algunos individuos pueden llegar a las Bahamas y a las Antillas.

El playero melódico era una especie abundante a lo largo de la costa atlántica durante el siglo XIX. Pero la cacería excesiva por su plumaje para el comercio de moda casi lo hizo desaparecer. Luego de establecerse el Tratado de Aves Migratorias (Migratory Bird Treaty Act) en 1918, su número aumentó y alcanzó un máximo en los años 1940. La presente reducción de su población se atribuye al aumento de desarrollo y uso recreativo de las playas que comenzó después de la segunda guerra mundial. Censos recientes de la población del Atlántico estiman que existen menos que 1000 parejas.



Habitos de Anidaje y Alimentación

El playero melódico llega a las áreas de anidamiento a finales de marzo o principios de abril. Luego de establecer su territorio, el playero hace su nido usualmente cerca de las dunas, el nido es una pequeña depresión en la arena que puede estar cubierta con fragmentos de caracoles o piedrecitas. Este playero deposita hasta cuatro huevos y los incuba por 25 días. Los polluelos son precoces ya que requieren un cuidado parental mínimo y que pueden seguir a los padres para ir en busca de alimento. La dieta del playero melódico consiste de gusanos, crustáceos pequeños e insectos que extrae de la arena.

El color de los huevos y los polluelos los confunde con la arena. Al acercarse algún depredador o intruso, los polluelos se agachan y se mantienen inmóviles mientras los padres tratan de captar la atención del intruso. Usualmente, esto lo hacen simulando un ala rota.

Desafortunadamente, las tormentas y las marejadas, los depredadores y disturbios humanos destruyen los nidos antes de que los polluelos eclosionen. En estos ocasiones, los playeros pueden volver a anidar en la misma zona pero sus crías no vuelan hasta finales de la temporada de anidaje. Los polluelos sobrevivientes vuelan a los 30 días aproximadamente.

Antes de comenzar su migración del otoño, los playeros se concentran en playas solitarias y ya para principios de septiembre adultos y juveniles habrán emprendido vuelo hacia el sur.

Amenazas

Varios factores amenazan la sobrevivencia del playero melódico en la costa del Atlántico.

- Los desarrollos comerciales, residenciales y recreativos han disminuido la cantidad de hábitat costal disponible para el playero melódico anidarse y alimentarse.
- Los disturbios humanos afectan el éxito reproductivo. El tráfico vehicular y pedicular puede aplastar nidos y polluelos. El exceso de perturbación puede causar que los padres abandonen sus nidos, dejando los huevos o los polluelos expuestos al sol y a depredadores. Así mismo, interrupciones en el proceso de alimentación pueden causar estrés en los polluelos durante períodos críticos en su desarrollo.
- Las mascotas, particularmente los perros, pueden perturbar a los playeros.
- Los desarrollos cerca de las playas producen desperdicios los cuales atraen un gran número de depredadores como mapaches, zorrillos y zorros. Gatos, domésticos y silvestres también son depredadores eficientes que destruyen los huevos y polluelos.
- Las marejadas pueden inundar los nidos.

Protección Bajo la ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act)

El 10 de enero de 1986 el playero melódico fué incluido en la Lista Federal de Especies en Peligro de Extinción. En la costa del Atlántico, el playero fué designado como especie vulnerable, lo cual significa que la población puede seguir disminuyendo si no se protege. La Ley de Especies en Peligro de Extinción prohíbe molestar, cazar, poseer, hacerle daño o matar al playero melódico y las penalidades pueden ser fuertes. La Ley también ofrece protección al hábitat de la especie.